

平成 28 年産八色すいか栽培管理日誌【収穫前提出用】

収穫前提出日：平成 28 年 7 月 8 日

収穫後提出日：平成 年 月 日

住所：新潟県

氏名：上村 有弘

JA 名	魚沼みなみ農業協同組合		
圃場面積	日誌番号	10 番	
	日誌総数	12 冊	
正式な圃場番号	南魚沼市	魚沼市	番地

圃場周辺作付作物	
東側	ズカ
西側	ズカ
南側	水稲
北側	水稲

自家育苗
購入先氏名
小沢秀幸

※苗購入者は購入先を記入願います。
自家育苗の方は○で囲んでください。

	受付日	生産工程管理者	JA
JA・生産部会			

種子消毒：ベノミル・チウラム台木粉衣処理1回

品 種	①：ひとりじめ7	②：ひとりじめHM	③：祭ばやし777	④：富士光TR
品種番号	(4)			
播 種 日	5月24日	月 日	月 日	月 日
定 植 日	5月6日	月 日	月 日	月 日
栽培条件	定植本数	630 本	本	本
	栽培方法	つる引き・密閉	つる引き・密閉	つる引き・密閉
収穫	開始予定日	8月1日	月 日	月 日
	開始日			
	中断日			
	再開日			
	終了日			

1. 土作り・施肥

施肥月日	肥料名	施肥量(実際投入量)	備考
平成 27 年 10 月 18 日	2499-7	250 kg	
平成 27 年 10 月 18 日	西谷x02 配合	180 kg	
平成 27 年 10 月 18 日	3447	120 kg	
平成 28 年 6 月 11 日	燐燐好加量	40 kg	
平成 28 年 6 月 11 日	Z-10-LA \$806	80 kg	
平成 28 年 6 月 11 日	3447	100 kg	
平成 年 月 日		kg	
平成 年 月 日		kg	
平成 年 月 日		kg	
液肥施用	施用量 5~10L/株	希釈倍率 300~500倍	施用月日

2. 防除履歴

用途	薬剤名	使用限度回数	収穫前使用限度	希釈倍率(使用量)	散布月日						備考	
					1	2	3	4	5	6		
除 草 剤	ブリグロックスL	3回以内	3日前	600~1,000mL	/	/	/					劇
	バスタ液剤	2回以内	前日	300~500mL	5/20	/						
	クレマトU粒剤	1回	定植・マルチ前	4~6kg	/							
	クレマト乳剤	1回	定植・マルチ前	200~400mL	/							使用はどちらか1剤のみ
	ナブ乳剤	1回	14日前	150~200mL	/							
	ガスタード微粒剤	1回	定植21日前	20~30kg	/							
展 着 剤	トレファノサイド粒剤 2.5	2回以内	45日前	4~5kg(畦間)	/	/						
	トレファノサイド乳剤	2回以内	45日前	200~300mL	/	/						合わせて使用合計2回以内
	ハイテンパワー	-	-	5,000~10,000倍	6/21	6/28	/	/	/	/		
そ の 他 散 布 農 薬	アブローチBI	-	-	2,000倍	/	/	/	/	/	/		
	ニーズ	-	-	1,000~2,000倍	/	/	/	/	/	/		
	アピオン-E	-	-	500~1,000倍	/	/	/	/	/	/		

用途	薬剤名	使用限度回数	収穫前使用限度	希釈倍率(使用量)	散布月日						備考		
					1	2	3	4	5	6			
殺 菌 剤	ダコニール 1000	5回以内	3日前	700~1,000倍	/	/	/	/	/				
	プロボーズ顆粒水和剤	5回以内	3日前	1,000倍	/	/	/	/	/			合わせて5回以内	
	フォリオゴールド	3回以内	7日前	800~1,000倍	/	/	/					合わせて3回以内	
	リドミルゴールドMZ	3回以内	7日前	1,000倍	/	/	/						
	ベンコゼブフロアブル	7回以内	7日前	600倍	/	/	/	/	/			合わせて7回以内	
	ジマンダイセン水和剤	7回以内	7日前	400~600倍	/	/	/	/	/				
	テーク水和剤	5回以内	7日前	600~800倍	/	/	/	/	/				
	ホライズンドライフロアブル	3回以内	前日	2,500倍	/	/	/						
	ランマンフロアブル	4回以内	前日	1,000~2,000倍	/	/	/	/					
	アントラコール顆粒水和剤	4回以内	前日	400~600倍	/	/	/	/					
	ロブラール水和剤	4回以内	前日	1,000倍	/	/	/	/					
	ポリベリン水和剤	4回以内	前日	1,000~2,000倍	/	/	/	/				合わせて4回以内	
	ベルコートフロアブル	4回以内	前日	1,000倍	/	/	/	/					
	アミスター 20フロアブル	4回以内	前日	2,000倍	/	/	/	/					
	オーソサイド水和剤 80	5回以内	14日前	400~800倍	/	/	/	/	/				
	ベンレート水和剤	5回以内	前日	2,000~3,000倍	6/21	/	/	/	/				
	スコア顆粒水和剤	3回以内	前日	2,000倍	6/28	/	/	/					
	シグナムWDG	3回以内	前日	1,500~2,000倍	/	/	/	/					
	アフェットフロアブル	3回以内	前日	2,000倍	/	/	/	/					
	レーバフロアブル	2回以内	前日	2,000倍	/	/	/	/					
	インプレッション水和剤	-	発病前~発病初期	500~1,000倍	/	/	/	/	/	/			
	タチガレン粉剤	2回以内	播種時	50~75g/床土50L	/	/						合わせて使用合計2回以内(土壌混和1回、土壌かん注1回)	
	タチガレン液剤	2回以内	播種直後	500~1,000倍	/	/							
	カスミンボルドー	5回以内	前日	1,000倍	/	/	/	/	/				
	トップジンM水和剤	5回以内	前日	1,500~2,000倍	/	/	/	/	/				
	殺 虫 剤	スタークル粒剤	1回	定植時	2g/株	/							
		ベストガード水溶剤	3回以内	7日前	1,000~2,000倍	/	/	/					
		ベストガード粒剤	1回	育苗期	1g/株	/							
アドマイヤー水和剤		3回以内	3日前	2,000倍	/	/	/					劇	
アドマイヤー1粒剤		1回	定植時	5g/株	5/6								
ランネート 45DF		4回以内	前日	1,000~2,000倍	/	/	/	/				劇	
テルスター水和剤		4回以内	前日	1,000倍	/	/	/	/					
アクタラ顆粒水溶剤		3回以内	前日	3,000倍	/	/	/						
ダントツ水溶剤		3回以内	前日	2,000~4,000倍	/	/	/						
ウララDF		2回以内	前日	2,000~4,000倍	6/28	/							
バロックフロアブル		2回以内	前日	2,000倍	/	/	/						
ニッソラン水和剤		2回以内	前日	2,000倍	/	/	/						
カネマイトフロアブル		1回	前日	1,000~1,500倍	/								
ダニサラバフロアブル		2回以内	前日	1,000倍	/	/	/						
スターマイトフロアブル		1回	前日	2,000倍	/							劇	
アグリメック		3回以内	前日	500~1,000倍	/	/	/					劇	
チェス顆粒水和剤	4回以内	3日前	5,000倍	/	/	/	/						
モベントフロアブル	3回以内	前日	2,000倍	/	/	/							
フェニックス顆粒水和剤	2回以内	前日	2,000~4,000倍	/	/	/							
プレバソフロアブル 5	3回以内	前日	2,000倍	/	/	/							
スピノエース顆粒水和剤	2回以内	前日	5,000倍	/	/	/							
コテツフロアブル	2回以内	前日	2,000~4,000倍	/	/	/					劇		
ダイアジノン粒剤 5	4回以内	14日前	4~6kg	/	/	/	/						
アフーム乳剤	3回以内	前日	1,000~2,000倍	/	/	/	/						