

十日町地域 稲作生育速報（令和7年6月19日）

十日町農業普及指導センター・十日町地域農業振興協議会魚沼米振興部会

○今後も高温が予想されています。中干し開始適期を逃さず、速やかに中干しを開始しましょう。

【水稻の生育状況】 コシヒカリの生育データ（6月19日現在）※（ ）内は指標値比・差

調査地点	育苗 様式	田植日	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉数 (葉)	葉色 (SPAD)
十日町（小黒沢） 標高 150m	稚苗	5/15	34 (94%)	312 (76%)	9.0 (+0.3)	39.1 (+0.1)
川西（上野） 標高 170m	稚苗	5/19	40 (111%)	366 (89%)	8.4 (-0.3)	45.4 (+6.4)
松之山（兎口） 標高 430m	中苗	5/23	44 (129%)	265 (124%)	7.9 (+0.5)	41.6 (+4.3)
津南（米原） 標高 450m	中苗	5/31	34 (94%)	173 (54%)	6.9 (-1.5)	36.6 (-7.4)

【気象予報】 北陸地方の1か月予報（新潟地方气象台 6月19日発表）

気温	降水量	日照時間
高い	平年並か少ない	多い

【今後の管理】

1 中干し・溝切り

- ・今後も高温が予想されているため、中干し開始適期（右表）を逃さず、速やかに中干しを開始しましょう。
- ・迅速なかん水や中干し効果を高めるためにも、溝切りを実施しましょう。

茎数の目安 (本/株)	
50 株植	60 株植
16～18	13～15

2 病虫害防除

- ・斑点米カメムシ類の発生防止のため、3週間程度の間隔で畦畔の草刈りを行いましょう。（3週間はイネ科雑草が穂をつけないようにするための間隔）
- ・いもち病に感染しやすい気象条件（高温多湿）の日が多くなっています。
葉いもちの早期発見、早期防除に努めましょう。

十日町農業普及指導センター（作物担当）

TEL 025-757-5516・6061

HP http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi_nogyo/suito.html

こまめな休憩と水分補給で熱中症を予防しましょう。



↑LINE 水稻情報
はこちらから

