十日町地域　稲作速報～収穫情報～（9/2 発行）

十日町農業普及指導センター・十日町地域農業振興協議会魚沼米振興部会

○　向こう１か月は気温の高い状態が続くため、収穫期が早まる可能性があります。
○　刈り遅れになると白未熟粒や胴割粒の発生リスクが高まるため、ほ場ごとに籾の黄化率を確認して適期に収穫しましょう。
　茎葉や穂軸は青くても籾は成熟している場合があるため、注意しましょう。
○　大規模経営体では、早めに収穫作業を開始し、刈り遅れを防ぎましょう。

【気象予報】 北陸地方１か月予報（新潟地方気象台８月 28 日発表、8/30～9/29）

気温	降水量	日照時間
高い	ほぼ平年並	多い

【コシヒカリの収穫適期のめやす】（９月１日現在）

地点	出穂期後の積算温度	出穂期（例）	収穫適期のめやす	
			今後、平年並の気温で推移した場合	【参考】今後、R5 年並の高温で推移した場合
標高 170m（十日町小泉）	1000℃ ※１	8/3	9/12	9/11
		8/6	9/16	9/14
		8/9	9/20	9/17
標高 452m（津南町米原）	1000～1050℃ ※１	8/8	9/21	9/18
		8/11	9/25	9/21
		8/14	9/29	9/25

※１　積算温度による収穫適期はめやすです。高温で推移した場合は 50℃（２日程度）早くなります。

※２　生育ボリューム、葉色、地力、標高等により適期は異なりますので、必ずほ場で籾の黄化率を確認しましょう。収穫適期は黄化籾の割合が 85～90%になった頃です(右図)。

※３　積算温度表は毎週火曜日に更新しています。



刈取適期判断を行う際の籾黄化の判断位置
（石川県農業総合研究センター）

こまめな休憩と水分補給で、熱中症を予防しましょう。安全確認と予防対策で、農作業事故を防ぎましょう。

十日町農業普及指導センター（作物担当）
TEL　025-757-5516・6061
HP　http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi_nogyo/suito.html

←LINE 水稲情報は
こちらから