

令和7年度 水稻収穫適期のめやす【9月9現在】

・表の積算温度を参考に収穫適期を予測し、作業計画を立てましょう。

*ほ場付近の刈取適期判定器も参考にしてください。

十日町農業普及指導センター

成熟期(月/日)

7

12

13

14

15

16

17

18

19

20

出穂期(月/日)

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

表 品種別収穫適期のめやす

品種

積算温度

五百万石

975℃

925℃～

つきあかり

1,100℃

950℃～

こがねもち

1,000℃

1,000℃～

コシヒカリ

1,000～1,050℃

1,050℃～

1,150℃～

ここに注目

こがねもちが黄化した頃が刈取始期

もみ黄化率 85%の穂

刈取適期判断を行う際の籾黄化の判断位置
(石川県農業総合研究センター)

この表はめやすです。
必ずほ場ごとに籾の黄化具合を確認して、収穫期を判断してください！

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

9/16

9/17

9/18

9/19

9/20

9/21

9/22

9/23

9/24

9/25

9/26

9/27

9/28

9/29

9/30

10/1

10/2

10/3

10/4

10/5

10/6

10/7

10/8

10/9

10/10

10/11

10/12

10/13

10/14

10/15

10/16

10/17

10/18

10/19

10/20

10/21

10/22

10/23

10/24

10/25

注 アメダス観測地点(津南町米原 標高452m)の観測気温を基に計算しています。

・出穂期後の日平均気温を足し算した積算気温です。（日平均気温は、9月8日まで本年値を使用。それ以降は平年値を使用し計算しました。）