

生育早い！中干し適期は田植え後25日！

5月21日から6月10日までの平均気温は平年差+1.9℃
(前年差+2.4℃)で、稲の生育は大きく進んでいます。

今年は、田植え後25日が中干し開始適期となるので、
遅れずに中干しをしましょう。

60株植え: 茎数15本/株 50株植え: 茎数18本/株
に達したら、直ちに中干しを開始しましょう！



中干し開始適期



中干し開始時期としては遅い

適期中干しで、適正
な生育量になるから、
穂肥が施用できて、
収量・品質が確保で
きるよ！



中干しは田面に小ヒビが入り、軽く足跡が付く程度まで！



小ヒビ



大ヒビ (乾かしすぎ)

乾かしすぎは品質
低下につながる恐
れがあるよ！



斑点米カメムシ対策

- ・斑点米カメムシ類の発生源をなくすため、水田内除草や、農道畦畔の草刈を徹底しましょう。(野焼きは禁止されています。)
- ・刈った草は、用水や河川に流さないようにしましょう。

【QRコードを読み取り稲作情報を確認しよう】

JA魚沼 北魚沼地区
営農情報 (LINE)
はこちら →



魚沼農業普及指導
センターHP稲作情報
はこちら →



お問い合わせ先

JA魚沼北魚沼基幹営農センター
025-793-1770

魚沼農業普及指導センター
025-792-1309

こまめな休憩と水分補給で、農作業中の熱中症を予防しましょう！